EPISODE
# 7-3
## ― 教授あなたの名前を ―

▼ Surgeon

▼ Data

[ 患　部 ] 脳
[ バイタル ] 80(99)
[ 手術時間 ] 5:00:00

▼ Notes

ウィルケン教授の脳内に埋め込まれた電子装置の解除を行なうエピソード。脳内の手術だけに一瞬のミスが命取りになる。

**The patient's Life is in your hands**

1. 中央部のチップ×3を回転物に触れないように回収(電子装置→P37)
2. 電子装置内部に術野が替わる
3. プラグ×5を摘出する(電子装置→P37)
4. 電子装置外部に切り替わる
5. 追加トレイの新しいチップ×3を中央部に設置(電子装置→P37)

**The patient is saved**

1 レールの上を移動する回転物の軌道を把握し、つかんだチップをトレイまで運ぼう。回転物に触れると失敗となる。

2 回転物が触れるまえにピンセットを離してチップを落下させれば、手術の評価は下がるが手術失敗は回避できる。

3-1 ランプが点灯していないプラグを垂直に抜こう。1回のミスでバイタルが大幅に低下するため、慎重に抜きたい。

3-2 1本だけ長いプラグが混ざっている。ほかのプラグよりもポインタをスライドさせる距離が長くなるので注意したい。

5-1 回転物のなかには、新しいチップをつかむと、レールから飛び出してポインタを追跡するタイプが存在する。

5-2 新しいチップは真ん中のエリアに置けばOK。チップ同士が重なっても問題ないので、中央にチップを置こう。

### SPECIAL BONUS

| SPECIAL BONUS 獲得条件 | Easy | Normal | Hard | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 超執刀を使用しない | | | | 1.4 |
| 第1段階の所要時間○○秒以下 | 20 | 12 | 5 | 1.2 |
| 第2段階の所要時間○○秒以下 | 20 | 15 | 15 | 1.2 |
| 第3段階の所要時間○○秒以下 | 20 | 12 | 10 | 1.2 |

### OPERATION RANK

| ランク | Easy | Normal | Hard |
|---|---|---|---|
| C | 0 ~ 1299 | 0 ~ 2399 | 0 ~ 3899 |
| B | 1300 ~ 1399 | 2400 ~ 2599 | 3900 ~ 4099 |
| A | 1400 ~ 1499 | 2600 ~ 2899 | 4100 ~ 4399 |
| S | 1500 ~ | 2900 ~ | 4400 ~ 4499 |
| XS | — | — | 4500 ~ |





EPISODE
# 7-4
## ― カフカスの兵器庫 ―

▼ Surgeon

▼ Data

[ 患　部 ] 右肺
[ バイタル ] 65(85)
[ 手術時間 ] 5:00:00

▼ Notes

スティグマ研究の主導的役割を担う組織のアジトでガス兵器の中毒患者を救う。毒物を特定して正しい薬剤を投与しよう。

**The patient's Life is in your hands**

1. 胸部を消毒して切開(切開→P24)
2. 破裂炎症の色を確認後、鎮静剤(灰色の液体)を投与し、破裂炎症と同色の薬(黄色)を投与(破裂炎症→P37)
3. バイタルを回復し、鎮痛剤を吸引(バイタル回復→P23、破裂炎症→P37)
4. 発生する破裂炎症×2の色を確認後、鎮静剤を投与し、破裂炎症と同色の薬(黄色×2)を投与する(破裂炎症→P37)
5. バイタルを回復し、鎮痛剤を吸引(バイタル回復→P23、破裂炎症→P37)
6. 発生する破裂炎症×3の色を確認後、鎮静剤を投与し、破裂炎症と同色の薬を投与する(破裂炎症→P37)
7. バイタルを回復し、鎮痛剤を吸引(バイタル回復→P23、破裂炎症→P37)
8. 発生する破裂炎症×3の色を確認後、鎮静剤を投与し、破裂炎症と同色の薬を投与する(破裂炎症→P37)
9. バイタルを回復し、鎮痛剤を吸引(バイタル回復→P23、破裂炎症→P37)
10. 発生する破裂炎症×5の色を確認後、鎮静剤を投与し、破裂炎症と同色の薬を投与する(破裂炎症→P37)
11. バイタルを回復し、鎮痛剤を吸引(バイタル回復→P23、破裂炎症→P37)
12. 発生する破裂炎症×5の色を確認後、鎮静剤を投与し、破裂炎症と同色の薬を投与する(破裂炎症→P37)
13. バイタルを回復し、鎮痛剤を吸引(バイタル回復→P23、破裂炎症→P37)
14. 発生する破裂炎症×5の色を確認後、鎮静剤を投与し、破裂炎症と同色の薬を投与する(破裂炎症→P37)
15. 胸部の閉創処置を行なう(閉創→P25)

**The patient is saved**

8 4回目に発生する炎症は、青が2つ、黄が1つ配置される。青より黄のほうが進行が速いので、黄を先に処置しよう。

10 5回目に発生する炎症は、赤が2つ、青が3つ配置される。赤のほうが進行が速いので、先に赤を処置してしまおう。

12 6回目に発生する炎症は、赤が3、青が2、黄が1。黄と青よりも、進行度が速い赤を先に治療しよう。

14 最後に発生する炎症は、赤が2、青が2、黄が1　炎症の進行度から考えて、赤→黄→青と治療したほうがいい。

### SPECIAL BONUS

| SPECIAL BONUS 獲得条件 | Easy | Normal | Hard | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Miss 判定無し | | | | 1.3 |
| ○○秒以上残して手術終了 ※ | 200 | 210 | 215 | 1.2 |
| MAX CHAIN ○○○以上 | 20 | 30 | 35 | 1.2 |
| 炎症を破裂させない | — | — | — | 1.3 |

※分表示ではそれぞれ、Easy3:20　Normal3:30　Hard3:35

### OPERATION RANK

| ランク | Easy | Normal | Hard |
|---|---|---|---|
| C | 0 ~ 1799 | 0 ~ 2899 | 0 ~ 4099 |
| B | 1800 ~ 1999 | 2900 ~ 3099 | 4100 ~ 4399 |
| A | 2000 ~ 2099 | 3100 ~ 3299 | 4400 ~ 4599 |
| S | 2100 ~ | 3300 ~ | 4600 ~ 4799 |
| XS | — | — | 4800 ~ |